



Date: 11/26/24

Dear Parent or Guardian,

Your child **was recently exposed to pertussis** (whooping cough) at Neillsville School District from 11/11/24-11/22/24. Pertussis is a contagious illness spread through coughing, sneezing, or singing. Pertussis is most dangerous for babies, the elderly, and people with weakened immune systems.

Pertussis Symptoms:

- **Early symptoms:** Runny nose, mild cough, and possibly a low-grade fever—similar to a cold.
- **Later symptoms (after 1-2 weeks):** Severe coughing fits that can make it hard to breathe, eat, or sleep. After coughing, your child might make a "whooping" sound when trying to breathe in and may also gag or vomit. These coughing spells can last for weeks or months. Vaccinated individuals may have milder symptoms without the "whoop."

What to Do:

- **Monitor** your child for cough illness. Symptoms usually appear 7-10 days after exposure but can show up as early as 5 days or as late as 21 days.
- **If symptoms appear:**
 - Get your child checked by a doctor as soon as possible. Early treatment is important to stop the spread of the disease.
 - Your child should be tested for pertussis and start antibiotic treatment the same day.
 - Keep your child at home until they have completed 5 days of antibiotics.
 - Your doctor will report positive test results to the health department.
- **If your child has a weakened immune system** (or other health condition like severe asthma):
 - Contact your child's doctor to prescribe antibiotics, even if your child isn't coughing.
- **If your child lives with someone at high risk** (pregnant woman, infant under 1 year, or someone with a weakened immune system):
 - Ask your child's doctor to prescribe antibiotics as a precaution, even if your child isn't coughing.
- **Make sure your child is up-to-date** on pertussis vaccinations. Check with your doctor or the Marathon County Health Department about your child's vaccination status.

If Your Child is Diagnosed with Pertussis:

- Inform your child's school.
- Keep your child home until they've completed 5 days of antibiotics, unless they've already been coughing for 21 days or more.
- Get a note from the doctor confirming the diagnosis.

If Your Child is Cleared by the Doctor (No Pertussis):

- Ask for a note from the doctor confirming that your child does not have pertussis and can return to school and activities.

For more information on pertussis, please visit dhs.wisconsin.gov/immunization/pertussis.htm.



Fecha: 11/26/24

Asunto: Notificación de tos ferina

Se ha notificado un caso de tos ferina en el Distrito Escolar de Neillsville. Su hijo puede haber estado expuesto desde 11/11/24-11/22/24. Si su hijo tiene o desarrolla síntomas de tos ferina, póngase en contacto con su médico.

Síntomas De La Tos Ferina:

- **Síntomas iniciales** Goteo nasal, tos leve y, posiblemente, fiebre baja, similar a la de un resfriado.
- **Síntomas posteriores (después de 1-2 semanas):** Ataques de tos intensos que pueden dificultar la respiración, la alimentación o el sueño. Después de toser, su hijo puede emitir un sonido al intentar inspirar y también puede tener arcadas o vómitos. Estos ataques de tos pueden durar semanas o meses. Las personas vacunadas pueden tener síntomas más leves.

Qué Hacer:

- **Vigile** a su hijo por si tiene tos. Los síntomas suelen aparecer entre 7 y 10 días después de la exposición, pero pueden manifestarse a los 5 o a los 21 días.
- **Si Aparecen Síntomas:**
 - Lleve a su hijo al médico lo antes posible. El tratamiento inmediato es importante para detener la transmisión de la enfermedad.
 - Hay que hacerle la prueba de la tos ferina y empezar el tratamiento antibiótico el mismo día.
 - Mantenga a su hijo en casa hasta que haya completado 5 días de antibióticos.
 - Su médico informará al departamento de salud de los resultados positivos de las pruebas.
- **Asegúrese de que su hijo está al día** de las vacunas contra la tos ferina. Consulte a su médico o al departamento de salud del condado de Marathon sobre el estado de vacunación de su hijo.

Prevenir la Transmisión:

- Lavarse las manos seguido.
- Cubrir la tos.
- Quédese en casa cuando esté enfermo.

Para obtener más información, sobre la tos ferina, visite dhs.wisconsin.gov/immunization/pertussis.htm.